ブロイラー飼養管理記録表

21 年 1 月 11 日

農場名	②	導入記録	月日	孵化場名	導入羽数	雛導入時での状況（活力・雛体重・ワクチン接種・異常）	♂♀区分
号舎	2、3、4		1/11	霧島	23,000 +2%	LOT1237w LOT5 46w 〃 1 28週令e+ (23,460)+サービス100羽(23,560)	

母鶏群の状況（種鶏LOT・週令・導入羽数）

晴 ○　くもり △　雨 ●

1w

天気・週令	1/11	12	13	14	15	16	17	18
日令	0	1	2	3	4	5	6	7
死亡羽数								
朝 AM8:00 低 外		-1	-2	-1	-2	-3	-3	6
朝 AM8:00 低 内		17	16	16	16	18	19	21
夕 PM6:00 高 外		7	8	12	10	12	14	13
夕 PM6:00 高 内		19	20	22	21	22	23	22
湿度（朝・夕平均） 外								
湿度（朝・夕平均） 内								

2w

天気・週令	19	20	21	22	23	24	25
日令	8	9	10	11	12	13	14
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外	4	5	7	8	5	-3	-2
朝 AM8:00 低 内	20	20	22	22	21	18	20
夕 PM6:00 高 外	13	13	13	12	13	7	10
夕 PM6:00 高 内	22	22	23	23	25	22	24
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

3w

天気・週令	26	27	28	29	30	31	2/1
日令	15	16	17	18	19	20	21
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外	3	4	3	7	10	8	3
朝 AM8:00 低 内	21	21	21	23	24	22	20
夕 PM6:00 高 外	9	12	13	14	17	13	13
夕 PM6:00 高 内	24	25	25	25	26	25	25
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

4w

天気・週令	2	3	4	5	6	7	8
日令	22	23	24	25	26	27	28
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外		5	5	4	4	3	3
朝 AM8:00 低 内	19	22	22	22	21	21	21
夕 PM6:00 高 外	15	12	13	14	12	13	13
夕 PM6:00 高 内	25	25	25	25	25	24	24
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

5w

天気・週令	9	10	11	12	13	14	15
日令	29	30	31	32	33	34	35
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外	4	4	5	3	7	9	12
朝 AM8:00 低 内	21	20	21	20	21	22	22
夕 PM6:00 高 外	17	17	17	19	18	20	20
夕 PM6:00 高 内	23	23	23	23	23	24	23
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

各週死亡計、累計死亡計、残存羽数

	各週死亡計	累計死亡羽数	週末残存羽数
1w	107 %	 %	 %
2w	206 0.89 %	313 1.36 %	23,147 100.6 %
3w	139 0.6 %	452 1.96 %	 %
4w	73 0.3 %	525 2.28 %	22,935 99.7 %
5w	89 0.39 %	614 2.67 %	22,846 99.3 %

マニュアル体重、①体重測定、②週増体、③日増体

	マニュアル体重	①	②	③
1w	♂ 164.5 ♀ 159.6 無 162.1			
2w	♂ 432.5 ♀ 407.3 無 419.9			
3w	♂ 821.4 ♀ 750.6 無 786.0			
4w	♂ 1,304.2 ♀ 1,156.7 無 1,230.7			
5w	♂ 1,829.2 ♀ 1,576.6 無 1,704.3			

飼料銘柄、使用量、薬剤名、添加量

1w	2w	3w	4w	5w
① 15		② 15 (30)	③ 15 (45) 10 (55)	5 (60) 15 (75)

備考（・ワクチネーション　・雛の異常（呼吸器音、解剖所見）　・飲水投薬、消毒　・管理作業　・機械設備の使用状況）

1w	2w	3w	4w	5w
初生 レンチン 60g×1日.	IB.SP	ビタミン2日. IBD レンチン 60g×2日.	ND	レンチン 60g×1日.

晴 ○　くもり △　雨 ●

6w

天気・週令	2/16	17	18	19	20	21	22
日令	36	37	38	39	40	41	42
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外	7	3	4	4	7	0	5
朝 AM8:00 低 内	20	17	18	18	19	17	18
夕 PM6:00 高 外	14	11	13	5	17	13	14
夕 PM6:00 高 内	21	20	20	20	21	20	20
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

7w

天気・週令	23	24	25	26	27	28	3/1
日令	43	44	45	46	47	48	49
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外	10	8	10	11	10	6	7
朝 AM8:00 低 内	20	19	19	17	17	15	15
夕 PM6:00 高 外	13	14	19	15	12	15	12
夕 PM6:00 高 内	20	20	22	18	17	17	16
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

8w

天気・週令	2	3	4 出荷	5 出荷			
日令	50	51	52	53	54	55	56
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外	2	3					
朝 AM8:00 低 内	13	14					
夕 PM6:00 高 外	13	13					
夕 PM6:00 高 内	16	15					
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

9w

天気・週令							
日令	57	58	59	60	61	61	63
死亡羽数							
朝 AM8:00 低 外							
朝 AM8:00 低 内							
夕 PM6:00 高 外							
夕 PM6:00 高 内							
湿度（朝・夕平均） 外							
湿度（朝・夕平均） 内							

各週死亡計、累計死亡計、残存羽数

	各週死亡計	累計死亡羽数	週末残存羽数
6w	78 0.34 %	692 3.0 %	22,768 98.9 %
7w	98 0.42 %	790 3.4 %	22,670 98.5 %
8w	45 %	835 3.6 %	 %
9w	 %	 %	 %

マニュアル体重、①体重測定、②週増体、③日増体

	マニュアル体重	①	②	③
6w	♂ 2,357.0 ♀ 1,971.5 無 2,165.4			
7w	♂ 2,884.8 ♀ 2,340.5 無 2,612.9			
8w	♂ 3,412.6 ♀ 2,684.9 無 3,048.8			
9w	♂ 3,940.4 ♀ 3,006.7 無 3,473.6			

飼料銘柄、使用量、薬剤名、添加量

6w	7w	8w	9w
15 (90) ④ 14 (104)	10 (114) 5 (119) 10 (129)	5 (134)	

備考（・ワクチネーション　・雛の異常（呼吸器音、解剖所見）　・飲水投薬、消毒　・管理作業　・機械設備の使用状況）

6w	7w	8w	9w
	別にサービス 100羽ありをプラスする. (22,770羽 99%)	出荷羽数 22,695(98.67%) 98.67%×2.98kg/羽 ÷ エサ134,000kg/肉 67,490kg = 280.3 PS エサ134,000kg/肉 67,490kg = 1.99 FC × 52.7日	

出荷実績

月日	日令	♂♀	羽数	重量	平均体重
			A		
			B		
			格		
			A		
			B		
			格		
			A		
			B		
			格		
合計					

飼料使用量（トン）		出荷成績	
前期	30	育成率	98.67
後期	60	平均体重	2.98
休薬	44	要求率	1.99
合計	134	日令	52.7
生鳥kg当り経費		P・S	280
ガス代		日増体	56.5
電気代		坪産肉量	170.8
薬品代		kg当り利益	
生鳥コスト		坪羽当り利益	